

بعد از برداشت پسته (حساس ترین مرحله تغذیه)			مرحله پر شدن مغز، خندان شدن و سنگین شدن پسته			بعد از گلدهی و گرده افشانی تا زمان تشکیل پوسته میوه و رشد تا مغزکردن پسته			تورم جوانه های درختان پسته و قبل از گلدهی (متورم شدن جوانه ها)		قبل از آغاز فصل رشد و دوره انباردهی درختان پسته (زمستان) دی و بهمن ماه			کود
آبان ماه	شهریور ماه تا اواخر مهر و آبان	شهریور ماه تا قبل از خزان	تیر و مرداد	اواخر تیر، مرداد و شهریور (یک ماه مانده به برداشت)	نوبت اول فاز اول مغز در تیرماه نوبت دوم مرداد ۲۰ روز مانده به برداشت	با شروع آبیاریهای اول از اسفند تا خزان درختان پسته	شروع از اردیبهشت	اردیبهشت تا اواسط خرداد در سه نوبت	اواخر اسفند ماه (۱) نوبت) در زمان متورم شدن جوانه پسته	آخرین آب قبل از سبز شدن درختان در اواخر اسفند ماه	اواسط پاییز و زمستان (دی و بهمن ماه)	زمستان خواب درخت	۱ کیلوگرم درخت	
														لئوناردیت
					۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار					۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار				ترن ۲۱
												۳-۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب		ماکرومیک
												۷۰۰-۱۲۰۰ گرم در صد لیتر آب		
		۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب					۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب			۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب		۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب		سیمبیو کمبی
		۱ لیتر در هزار لیتر آب								۱ لیتر در هزار لیتر آب				بی او روی
		۵ لیتر در هکتار		۵ لیتر در هکتار			۵ لیتر در هکتار			۵ لیتر در هکتار		۵ لیتر در هکتار		پرو هومیک
										۱.۵-۲ لیتر در هزار لیتر آب				سنوکس
		۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب												کلسیم ۱۳۵
														۲۰.۲۰.۲۰
														کوالیتی کا یا ۴۵۴
														۱۲.۱۲.۳۶
														پرو کا پی اس
														پرو پلی فوس

* ۷۵۰-۱۲۰۰ گرم لئو نیز می توان جایگزین لئوناردیت استفاده کرد.